

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 23-9-74 087744

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 86-36-24)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

C.C.P. : La Source 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

30 Francs

BULLETIN TECHNIQUE N°34

20 SEPTEMBRE 1974

## ALTISES DU COLZA

## CULTURES OLEAGINEUSES

Les petites altises du colza et la grosse altise du colza ont déjà été observées notamment sur les repousses. Il est donc à craindre que ces ravageurs envahissent les jeunes semis dès leur levée. L'enrobage des semences n'assure qu'une protection partielle des plantules contre les attaques de la grosse altise.

Il est donc conseillé de surveiller attentivement les semis dès le début de la levée afin d'intervenir si l'on observe plus de 2 à 3 adultes par mètre carré. Mais l'observation directe dans les cultures est difficile car l'activité de ces ravageurs est surtout nocturne.

La cuvette jaune utilisée contre les autres ravageurs du colza permet de détecter la présence et de suivre l'évolution de la population des altises adultes. La cuvette doit être enterrée de telle façon que le bord dépasse de 1 à 2 cm le niveau du sol.

## ANTHONOME DU POIRIER

## ARBRES FRUITIERS

Dans les très rares vergers où ce ravageur fait encore des dégâts, il est conseillé d'effectuer un traitement en utilisant l'un des produits mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné en tenant compte des délais d'emploi des pesticides tels qu'ils ont été précisés dans le bulletin technique du 5 Avril.

## TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Nous rappelons que dans tous les vergers où la maladie est présente, une protection permanente des fruits doit être assurée jusqu'à la récolte et que les traitements doivent être effectués en fonction des lessivages par les pluies. Ces traitements tardifs contre les tavelures ont également une efficacité contre les maladies de conservation.

## PSYLLES DU POIRIER

Les indications données dans nos précédents bulletins restent toujours valables. Il y a lieu de surveiller attentivement les vergers de poiriers afin d'intervenir le cas échéant contre ces ravageurs dont les attaques tardives sont parfois dangereuses.

## TEIGNE DU POIREAU

## CULTURES LEGUMIERES

Le quatrième vol est commencé et des pontes ont été déposées. Un traitement est à envisager au cours de la semaine prochaine en utilisant l'un des produits mentionnés dans le bulletin technique du 13 Juin.

## SEPTORIOSE DU CELERI

Les conditions climatiques sont devenues favorables à cette maladie. Des taches ont été observées ces derniers jours. Les indications données dans notre bulletin technique du 13 Juin restent toujours valables.

## MILDIOU DE LA TOMATE

Les conditions climatiques deviennent favorables à l'évolution tardive de cette maladie. En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement et de le renouveler chaque fois que les pluies auront diminué son efficacité.

RESULTATS DU CONCOURS POUR LA DETECTION DES FOYERS PRIMAIRES DE MILDIOU

DE LA VIGNE EN 1974

- DEPARTEMENT DU CHER -

50 F : M. MARDON Pierre - QUINCY - 18120 - LURY SUR ARNON

- DEPARTEMENT DE L'INDRE -

50 F : M. LEBERT Roger - LA VERNELLE - Le Bourg - 36600 - VALENCAY

- DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE -

50 F : M. DARDEAU René - LA MILLETIERE - 37270 MONTLOUIS

30 F : M. MEUNIER Michel - CANGEY FLEURUS - 37400 - AMBOISE

- DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER -

50 F : M. BUET Jean - 21, rue des Flandres - 41130 - SELLES SUR CHER

30 F : M. GIBAUT Roland - POUILLE - 41110 - SAINT AIGNAN SUR CHER

Les Ingénieurs chargés des  
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"CENTRE"

G. RIBAUT

B. LELIEVRE

G. BENAS